

Приложение 1  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
17.05.2018 № 42

Национальный календарь  
профилактических прививок

Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц и сроки проведения профилактических прививок
Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
Туберкулез	Новорожденные на 3 - 5-й день жизни
Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев
Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 18 месяцев
Полиомиелит	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет
Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет
Дифтерия и столбняк	Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет
Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет
Грипп	Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок профилактические **прививки против пневмококковой инфекции** проводятся детям в соответствии с возрастом, а также детям других возрастов до достижения ими 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:

- иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания, связанные с назначением иммуносупрессивной терапии или лучевой терапии, злокачественные новообразования, лейкозы, лимфомы,

болезнь Ходжкина, после трансплантации донорского органа, врожденный иммунодефицит, функциональная или анатомическая аспления (серповидно-клеточная анемия, другие гемоглобинопатии, врожденная или приобретенная аспления));

- рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3-х эпизодов в течение года);

- рецидивирующие пневмонии;

бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, первичная цилиарная дискинезия, дефицит  $\alpha 1$ -антитрипсина;

- пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;

наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;

сахарный диабет;

бронхиальная астма;

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок профилактические **прививки против гемофильной инфекции** проводятся детям, ранее не получившим вакцинацию, до достижения ими 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:

- хронический гепатит;

- цирроз печени;

- хронические заболевания почек, сердца и легких;

- иммунодефицитные состояния;

- муковисцидоз.

Для всех других детей вакцинация носит рекомендательный характер.